

M. le Secrétaire général donne lecture des présentations faites par le Conseil pour le renouvellement du Bureau et du tiers sortant du Conseil.

M. Fred VLÈS fait une communication sur la locomotion de la Nucule.

M. le D^r TROUSSERT offre à la Société un travail sur un Acarien parasite de la Marmotte des Alpes, ainsi que le deuxième fascicule du supplément à son *Catalogue des Mammifères*, fascicule consacré aux Rongeurs. Il fait à ce propos une communication sur certains facteurs du transformisme et en particulier sur la convergence.

M. le D^r PELLEGRIN fait une communication sur les Poissons recueillis par M. ALLAUD dans la région du lac Victoria Nyanza. Sur 25 espèces recueillies, 3 sont nouvelles (4 Cyclidés et 1 Cyprinidé). Une courte diagnose sera publiée dans le *Bulletin*; le travail détaillé paraîtra dans les *Mémoires*. Il résulte de la communication de M. Pellegrin que la faune serait très voisine de celle de la Palestine. MM. ALLAUD et TROUSSERT font remarquer l'intérêt de ce fait, qui vient confirmer les données géologiques sur la communauté d'origine de ces deux régions.

M. DAUTZENBERG offre à la Société un travail sur la nomenclature, demandant que pour les noms génériques on puisse remonter au-delà de l'année 1738.

DIAGNOSES PRÉLIMINAIRES DE POISSONS NOUVEAUX DU LAC VICTORIA, RECUEILLIS PAR M^r ALLAUD (1)

PAR

LE D^r JACQUES PELLEGRIN

NEOBOLA ARGENTEA nov. sp.

D. 9; A. 16-17; Ec. 9-10 | 48-52 | 3; L. lat. 48-52.

Hauteur du corps 4 fois 1/4 à 4 fois 1/2 dans la longueur sans la caudale, longueur de la tête 3 fois 3/4 à 4 fois. Longueur du museau un peu inférieure au diamètre de l'œil qui est contenu 3 fois

(1) Une liste détaillée de tous les Poissons rapportés par M^r ALLAUD de son voyage dans l'Afrique orientale anglaise sera donnée ultérieurement dans les *Mémoires* de la Société Zoologique de France.

dans la longueur de la tête. Bouche dépourvue de barbillons, n'atteignant pas le bord antérieur de l'œil. Sous orbitaires beaucoup plus grands que la portion nue de la joue. Ligne latérale fort nette. Une seule écaille entre celle-ci et la ventrale. Ventre arrondi, non tranchant. Pectorale pointue faisant les $\frac{3}{4}$ ou les $\frac{4}{5}$ de la tête et n'atteignant pas la ventrale. Dorsale commençant juste au-dessus de l'origine de l'anale. Pédicule caudal 2 fois aussi long que haut. Caudale fourchue.

Brun-jaunâtre sur le dos, côtés de la tête et flancs argentés. Longueur totale : 38 à 70 millimètres.

Seize exemplaires de la baie de Kavirondo.

Ce joli petit Cyprin, à apparence de Clupe, se place entre le *Barilius sardella* Günther et le *Neobola Bottegoi* Vinciguerra.

PARATILAPIA PROGNAETHUS *nov. sp.*

D. XIV-XVI 9-10; A. III 8-9; Ec. 4 $\frac{1}{2}$ -5 | 30-32 | 11-13;

L. lat. $\frac{19-23}{11-14}$; Br. 8-10.

Hauteur du corps 2 fois $\frac{1}{2}$ à 3 fois dans la longueur; longueur de la tête 2 fois $\frac{1}{2}$ à 2 fois $\frac{3}{4}$. Trois à quatre rangées de dents aux mâchoires, les externes plus volumineuses, crochues, espacées, coniques, au nombre d'une vingtaine de chaque côté à la mâchoire supérieure. Museau faisant 1 fois $\frac{1}{2}$ à 2 fois le diamètre de l'œil, qui est contenu 3 fois $\frac{1}{2}$ à 4 fois $\frac{1}{2}$ dans la longueur de la tête. Mâchoire inférieure fortement proéminente. Quatre à cinq rangées d'écailles sur la joue. Branchiospines courtes. Écailles cténoïdes. Pectorale faisant des $\frac{2}{3}$ aux $\frac{3}{4}$ de la tête. Épines dorsale croissantes, la dernière contenue 2 fois $\frac{3}{4}$ à 3 fois dans la longueur de la tête. Pédicule caudal un peu plus long que haut. Caudale tronquée.

Brun au-dessus, argenté au dessous; tache operculaire. Une ligne sombre de l'opercule à l'origine de la caudale.

Longueur totale : 85 à 175 millimètres.

Sept exemplaires de la baie de Kavirondo.

Ce Cichlidé est voisin de *Paratilapia vittata* Boulenger et de *Paratilapia sacra* Günther.

PARATILAPIA VICTORIANA *nov. sp.*

D. XVI 9; A. III 8; Ec. 5 $\frac{1}{2}$ | 33 | 12; L. lat. $\frac{20}{12}$; Br. 10.

Hauteur du corps 2 fois $\frac{1}{3}$ dans la longueur, longueur de la tête 2 fois $\frac{4}{5}$. Trois rangées de dents aux mâchoires, les externes assez

petites, régulières, rapprochées, au nombre d'une trentaine de chaque côté à la mâchoire supérieure. Museau faisant 1 fois $\frac{1}{3}$ le diamètre de l'œil qui est contenu 4 fois dans la longueur de la tête. Mâchoire inférieure proéminente. Quatre rangées d'écaillés sur la joue. Branchiospines courtes. Écaillés cténoïdes. Pectorale pointue aussi longue que la tête, atteignant l'anale molle. Épines dorsales subégales à partir de la 7^e, la dernière contenue 2 fois $\frac{1}{2}$ dans la longueur de la tête. Pédicule caudal un peu plus long que haut. Caudale tronquée.

Ardoisé au-dessus, argenté au dessous; point operculaire. Sur le pédicule caudal une ligne foncée longitudinale peu distincte.

Longueur totale : 150 millimètres.

Un exemplaire de la baie de Kavirondo.

Voisin du précédent, mais corps plus élevé, museau plus court, dents plus fines, épines dorsales plus longues et subégales, pectorale plus longue.

TILAPIA GUIARTI *nov. sp.*

D. XVI 8; A. III 8; Ec. 4 $\frac{1}{2}$ | 32 | 11; L. lat. $\frac{21}{13}$; Br. 10.

Hauteur du corps 3 fois $\frac{1}{4}$ dans la longueur, longueur de la tête 3 fois. 3 rangées de dents à chaque mâchoire, les externes plus volumineuses bicuspidés, les internes petites, tricuspides. Museau à profil droit faisant 1 fois $\frac{1}{3}$ le diamètre de l'œil qui est contenu 3 fois $\frac{1}{2}$ dans la longueur de la tête. Maxillaire n'arrivant pas tout à fait au bord antérieur de l'œil. 4 rangées d'écaillés sur la joue. Branchiospines courtes. Écaillés habituellement denticulées. Pectorale pointue faisant les $\frac{3}{4}$ de la tête. Épines dorsales à peine croissantes à partir de la 6^e, la dernière faisant environ le $\frac{1}{3}$ de la longueur de la tête. Pédicule caudal 1 fois $\frac{1}{2}$ aussi long que haut. Caudale tronquée.

Grisâtre au dessus, argenté au dessous; tache operculaire. Dorsale avec 2 ou 3 rangées longitudinales de petites taches foncées arrondies. Caudale tachetée.

Longueur totale : 145 millimètres.

Un exemplaire de la baie de Kavirondo.

Dentition de *Tilapia* fort nette, mais affinités avec *Estatotilapia Livingstonei* Günther et le *Pantilapia serranus* Pfeffer.